



ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU W ODNIESIENIU DO WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

- zabezpieczenie epizootyczne fermy, a w szczególności zwrócenie uwagi:
 - zabezpieczenie obiektów, w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich ptaków,
 - wydzielenie miejsca do składowania środków odkażających, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
 - posiadanie środków odkażających w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania,
 - bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego na fermie,
 - zwalczanie gryzoni,
 - zabezpieczenie paszy i ściółki przed dostępem ptaków dzikich i gryzoni,
 - stosowanie paszy pochodzącej ze znanego źródła,
 - zabezpieczenie fermy w maty odkażające,
 - prowadzenie rejestru środków transportu, które wjeżdżają na teren fermy, oraz rejestru wejść osób trzecich (lekarze weterynarii, pracownicy techniczni) do pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób;
 - odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren fermy,
 - zapewnienie, aby osoby mające kontakt z drobiem na fermie nie utrzymywały własnego drobiu oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą drobiu w innych gospodarstwach,
 - zakaz wejścia do budynków, w których utrzymywany jest drób osób postronnych,
 - posiadanie odzieży i obuwia przeznaczonego tylko do obowiązkowego użycia na fermie,
 - miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
- prowadzenie dziennych zapisów dotyczących upadków drobiu w podziale na poszczególne stada,
- prowadzenie na bieżąco ewidencji leczenia zwierząt,
- informowanie lekarzy wet. obsługujących fermę, powiatowego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza, prezydenta o nagłych dużych lub nieustannych padnięciach drobiu z nieznanymi przyczynami.